

Tlak:

- systolický
- diastolický
- Hypertenze (vysoký krevní tlak) nad 140/90
- Hypotenze (nízký krevní tlak) pod 100/70

Pulz:

- Tachykardie – nad 90/min
- Bradykardie – pod 60/min
- Dospělý – 70 – 80/min
- Dítě (10 let) – 90/min
- Kojenec – 100-120/min
- Novorozenec – 120-140/min

Dech:

- Eupnoe – normální dýchání
- Tachypnoe – zrychlené dýchání
- Bradypnoe – zpomalené dýchání
- Apnoe – zástava dýchání
- Apnoické pauzy – chvíle bezdeší mezi jednotlivými vdechy
- Dyspnoe – dušnost – pocit nedostatku vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím
- Ortopnoe – těžká dušnost, projevující se namáhavým a ztíženým dýcháním
- Kussmaulovo dýchání – hluboké, zrychlené, u selhání ledvin
- Cheyne-Stokesovo dýchání – střídavé prohlubování a zrychlování dechů, naopak, apnoická pauza (edém mozku)
- Biotovo dýchání – hluboké vdechy, normální frekvence, apnoické pauzy – u poruch mozku
- Hyperventilace – zrychlení a prohloubení dýchání
- Hypoventilace – zrychlené dýchání malých dechových oběmů

Tělesná teplota:

- Hypotermie – snížená teplota (pod 36)
- Normotermie – fyziologická teplota (36 – 36,9)
- Subfebrilie – zvýšená teplota (37 – 37,9)
- Febrilie – horečka (nad 38)
- Hyperpirexie – vysoká horečka (nad 40)

Vylučování moče:

- Mikce – močení
- Diuréza – množství moče za jednotku času (většinou 24 h)
- Polyurie – více než 3000 ml za 24 h
- Oligurie – 100 – 500 ml za 24 h)
- Anurie – méně než 100 ml za 24 h
- Retence – zadržení moče v moč. Měchýři
- Nykturie – noční močení
- Dysurie – bolestivé močení, pálení a řezání
- Strangurie – řezání při močení

- Polakisurie – časté močení při nezvětšeném množství moče
- Paradoxní ischurie – odkapávání moče z přeplněného močového měchýře
- Inkontinence – neudržení moče
- Celková inkontinence – neočekávané kontinuální vylučování moče – neurolog. porucha
- Stresová inkontinence – unikání malého množství moče při zvýšení nitrobršního tlaku (smích, kašel)
- Urgentní inkontinence – bývá po náhlém nucení na močení, kdy jedinec není schopen nucení na močení potlačit
- Enuresis diurna – denní pomočování (dítě i dospělý močí ve dne i v noci ve spánku ve věku kdy již normálně má ovládat vylučování
- Enuresis nocturna – noční pomočování

Vylučování stolice:

- Zácpa (obstipace) – vylučování malého množství nebo úplná zástava
- Paradoxní průjem – důsledek skybaly – tvoří se hlen který obtéká
- Průjem (diarrhoea) – časté vylučování tekuté stolice – ztráta iontů a vody
- Inkontinence stolice – nekontrolovatelný odchod stolice např. u poranění páteře
- Plynatost (flatulence) – nadměrné množství plynů ve střevech, způsobuje nadýmání (meteorismus)
- hemeroidy – rozšířené žíly v anální oblasti, bolesti, svědění a krvácení
- Acholická stolice – stolice stříbrošedá, vzniká při poruše odtoku žluči do střeva
- Meléna – černá, dehtovitá stolice – vzniká při krvácení do trávicího traktu
- Enterorágie – řídká stolice s příměsí čerstvé krve, vzniká při krvácení do dolní části trávicí trubice